



## Brustkorb- Bauch-Becken- verletzungen

Leichtere Formen der Brustkorbverletzungen sind Prellungen der Rippen und des Brustbeins oder ein Bruch einer einzelnen Rippe.

Bei schweren Verletzungen des Brustkorbs sind meistens mehrere Rippen oder das Brustbein gebrochen und manchmal auch die darunterliegenden Organe wie Lunge, große Gefäße oder Herz betroffen. Diese Verletzungen sind lebensbedrohlich, weil es neben einer massiven Atemstörung zu starken inneren Blutungen kommt.

### INFO

Innere Blutungen sind für Ersthelfer\*innen nicht erkennbar, eine Blutstillung daher auch nicht möglich. Derartige Blutungen können auch erst nach Stunden lebensbedrohlich werden.

Verletzungen der Bauchorgane wie Leber, Nieren, Milz, Bauchspeicheldrüse, Magen-Darm-Trakt oder großer Blutgefäße im Bauch sind mit lebensbedrohlichen inneren Blutungen verbunden.

Bei Beckenverletzungen, insbesondere bei instabilen Beckenbrüchen, ist die Gefahr einer lebensbedrohlichen inneren Blutung sehr hoch. Oft sind die Organe im Unterleib (Harnblase, Harnleiter, Mastdarm, Gebärmutter) ebenfalls verletzt. Häufig sind Beckenverletzungen gemeinsam mit Wirbelsäulenverletzungen zu sehen.

### ACHTUNG

Offene Wunden am Brustkorb dürfen nicht luftdicht abgedeckt werden. Punktuelle Blutungen des Brustkorbes sind durch direkten, manuellen Druck zu stillen.

### URSACHEN

- Gewalteinwirkung von außen
- Sturz, Absturz in die Tiefe
- Sturz auf Gegenstände (z.B. Lenkrad des Fahrzeuges, Fahrradlenker)